

## PRECAUCIONES

### PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, máscara facial completa, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.

### PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con abundante agua limpia 10 -15 minutos.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata llevando la etiqueta.

En caso de emergencia, comunicarse con Centro Toxicológico RITA-CHILE al: 22 777 1994 (Stgo). Horario de atención 24 hrs.

**SÍNTOMAS POSIBLES:** Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

**ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico.

**TIEMPO DE REINGRESO:** 120 minutos (previa ventilación del lugar de al menos 60 min.)



## INSECTICIDA NATURAL • BAJA TOXICIDAD • EMULSIÓN ACUOSA

# SPEE 3 EW



SPEE 3 EW, insecticida piretroide de origen natural de cuarta generación recomendado para el control de plagas rastreras y voladoras



### COMPOSICIÓN:

- Piretrinas Naturales 3 g.
- Butóxido de Piperonilo 15 g.
- Ingredientes inertes c.s.p. 100 cc.

Reg. I.S.P. N° P-438/16

**USO PROFESIONAL**

**1 LITRO**

**INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

SPEE 3 EW, insecticida de origen natural, para uso en interiores y exteriores en tratamientos espaciales o residuales. Recomendado especialmente para el control de plagas de: Moscas, Zancudos, Polillas de telas y de granos almacenados, Tábanos, Avispas, Baratas, Hormigas, Arañas, Pulgas, Piojos, Chinchas, Vinchucas, Tijeretas, Garrapatas, Termitas, Gorgojos.

SPEE 3 EW, es una revolucionaria formulación de baja toxicidad basada en agua y cuyo ingrediente activo es la Piretrina Natural, la que ha sido potenciada agregando Butóxido de Piperonilo en la formulación.

SPEE 3 EW, posee un fuerte flushout, rápido volteo y alta mortalidad. No es irritante, no mancha ni deja olor.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** SPEE 3 EW, actúa por contacto e ingestión, interfiere la transmisión del impulso nervioso del insecto, provoca parálisis y luego la muerte de éste.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### TRATAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

MÉTODO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
Ultra-Bajo Volumen (manual)	Voladores	Interior	100 cc.	Sin diluir	3.000 m <sup>3</sup>
		Exterior	500 cc.		10.000 m <sup>2</sup>
	Rastreros	Interior	200 - 400 cc.		3.000 m <sup>3</sup>
Nebulización Térmica (manual)	Voladores	Interior	100 cc.	1 Lt. de agua	3.000 m <sup>3</sup>
Nebulización Fría	Voladores	Interior	200 cc.	1 Lt. de agua	3.000 m <sup>3</sup>
	Rastreros	Interior	400 cc.	1 Lt. de agua	3.000 m <sup>3</sup>

#### TRATAMIENTO SOBRE SUPERFICIES

TIPO DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR	DOSIS DEPOSITADA (i.a/ m <sup>2</sup> )
Tratamiento No residual (manual)	100 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>	30 mg.
Tratamiento Residualidad Corta (1-2 semanas)	500 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>	150 mg.

Fabricado y Distribuido por: ANASAC CHILE S.A.  
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa, Santiago - CHILE

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

**CUIDADO**

